

# ABACAVIR

Autre NOM : Ziagen®

## POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

L'abacavir est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui fait partie de la catégorie des inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse (INTI). Il est utilisé en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ce faisant, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des lymphocytes CD4<sup>+</sup>) et vous serez mieux protégé contre les infections.

L'abacavir ne guérit pas le SIDA et ne détruit pas complètement le VIH, mais peut empêcher des dommages additionnels en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de l'abacavir ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Il est toujours possible de transmettre le VIH par contact sexuel, contact sanguin ou échange d'aiguilles. Vous devriez toujours utiliser les précautions appropriées pour éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT ce médicament doit-il être pris?

En général, la dose est de 300 mg deux fois par jour. L'abacavir peut être pris avec ou sans nourriture.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 300 mg :

\_\_\_\_\_ comprimé ( \_\_\_\_\_ mg) \_\_\_\_\_ fois par jour

ou

solution orale à 20 mg / mL :

\_\_\_\_\_ mL ( \_\_\_\_\_ mg) \_\_\_\_\_ fois par jour

## Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose d'abacavir, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement votre dose habituelle.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre l'abacavir, la quantité de VIH dans votre sang (connue sous le nom de charge virale) commencera à augmenter encore et votre système immunitaire s'en trouvera affaibli. Quelques doses oubliées peuvent être suffisantes pour que l'abacavir cesse d'être actif. Un phénomène qu'on appelle **résistance**. Lorsque cela se produit, les autres antirétroviraux qui agissent de la même manière que l'abacavir peuvent devenir inactifs aussi. **Par conséquent, les doses oubliées d'abacavir peuvent diminuer les futures options thérapeutiques.** N'arrêtez pas de prendre l'abacavir sans d'abord en parler à votre médecin.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

La majorité des effets indésirables rapportés sont légers et peuvent comprendre : nausées, mal de tête, douleur musculaire ou perte d'énergie.

Rarement (4 % des patients) une réaction grave appelée **RÉACTION D'HYPERSENSIBILITÉ** peut survenir avec l'abacavir. Cette réaction se produit habituellement au cours des 6 premières semaines de traitement par abacavir. Plusieurs personnes, mais pas toutes auront une

**éruption cutanée (plaques rouges sur la peau).** Cette réaction peut inclure des **symptômes pseudo-grippaux tels que fièvre, frissons, douleurs musculaires et articulaires, fatigue et une sensation générale de ne pas se sentir bien.** D'autres **symptômes possibles pouvant accompagner cette réaction sont : nausées, vomissements, diarrhée, ulcères dans la bouche, ampoules sur la peau, enflure du cou, des yeux et de la langue, rougeur des yeux, essoufflement, toux, mal de gorge et tension artérielle basse.**

**Communiquez avec votre médecin immédiatement si vous avez une éruption cutanée ou deux des autres symptômes mentionnés ci-dessus lorsque vous prenez l'abacavir.** Vous devrez être évalué et vous devrez peut-être arrêter de prendre le médicament de façon permanente. **Si on vous dit d'arrêter de prendre l'abacavir, vous ne devez JAMAIS prendre l'abacavir une autre fois car il pourrait provoquer une réaction pouvant menacer votre vie. Vous ne devez JAMAIS prendre Trizivir<sup>MC</sup>, puisque ce médicament contient aussi de l'abacavir.**

Si vous ne pouvez pas rejoindre votre médecin ni votre pharmacien, vous pouvez communiquer avec la Ligne de soutien canadienne pour Ziagen®. Le personnel bilingue pourra répondre à votre appel. Le numéro de téléphone sans frais est le 1-800-868-8898.

**Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?**

Vous devez vous assurer que vous prenez la bonne dose. Si vous prenez des doses plus

élevées d'abacavir que ce qui vous a été prescrit, vous pouvez augmenter vos chances d'avoir des effets indésirables. Si vous prenez des doses plus faibles d'abacavir que ce qui vous a été prescrit, le VIH peut devenir résistant à l'abacavir.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de l'abacavir. L'abacavir peut aussi influencer l'effet d'autres médicaments que vous prenez. Mentionnez le nom des médicaments prescrits et non prescrits que vous prenez à votre médecin et à votre pharmacien. Mentionnez aussi les produits naturels que vous prenez. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Veuillez mentionner à votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin peut recommander le traitement approprié pour réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. Il n'est pas recommandé d'allaiter si vous avez le VIH car vous pouvez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

#### **Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

L'abacavir devrait être entreposé dans un endroit frais (2 – 30 °C) et sec, protégé de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder le produit dans la salle de bain ni dans la cuisine, car la chaleur et l'humidité peuvent rendre le médicament moins actif.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en avec votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions.

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_  
**Téléphone:** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Ziagen® (abacavir). Saint-Laurent, Qc, Canada: GlaxoSmithKline, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et des mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : [www.tthivclinic.com](http://www.tthivclinic.com)

***ABACAVIR***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***