

DELAVIRDINE

Autre NOM : Rescriptor®

POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La delavirdine est un agent antirétroviral (anti-VIH) qui fait partie de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Elle est utilisée en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des lymphocytes CD4+) et vous serez mieux protégé contre les infections.

La delavirdine ne guérit pas le SIDA ni ne détruit complètement le VIH, mais peut empêcher des dommages additionnels en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de delavirdine ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Il est toujours possible de transmettre le VIH par contact sexuel, contact sanguin ou échange d'aiguilles. Vous devriez toujours utiliser les précautions appropriées pour éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

COMMENT ce médicament doit-il être pris?

En général, la dose de delavirdine est de 400 mg (4 comprimés) trois fois par jour ou 600 mg (6 comprimés) deux fois par jour. La delavirdine peut être prise avec ou sans nourriture.

Les comprimés de delavirdine doivent être avalés en entier avec de l'eau. Si vous avez de la difficulté à avaler les comprimés, vous pouvez les faire dissoudre dans un verre d'eau, mélanger l'eau puis boire. Rincez ensuite le verre avec un peu d'eau et boire pour être certain d'avoir pris toute la dose.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 100 mg :

_____ comprimés (_____mg) _____ fois par jour

Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de delavirdine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, suivez simplement la dose habituelle.

Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre une dose de delavirdine, la concentration du VIH dans votre sang (charge virale) recommencera à augmenter et votre système immunitaire sera affaibli. La delavirdine peut cesser d'être efficace même si vous n'oubliez que quelques doses. Un phénomène de **résistance médicamenteuse** peut alors survenir. D'autres antirétroviraux semblables à la delavirdine peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, si vous oubliez de prendre des doses de delavirdine, vous pourriez diminuer le nombre d'options de traitement pour l'avenir.** Même si vous ne vous sentez pas bien, vous devriez toujours prendre vos doses de delavirdine. Ne cessez pas de prendre la delavirdine sans d'abord en discuter avec votre médecin.

Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

L'effet indésirable le plus couramment observé avec la delavirdine est une légère éruption cutanée (plaques rouges sur la peau). Avisez votre médecin si vous avez une éruption

cutanée pendant le traitement à la delavirdine. Dans la majorité des cas, cet effet peut être traité à l'aide d'anti-inflammatoires ou d'antihistaminiques. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un médicament pour traiter une éruption cutanée.

Si vous présentez une éruption grave ou une éruption accompagnée de symptômes tels que fièvre, ampoules sur la peau, ulcères dans la bouche, rougeur dans les yeux, enflure, douleurs musculaires ou articulaires ou sensation de malaise général, **CESSEZ** de prendre la delavirdine et **consultez immédiatement votre médecin.**

D'autres effets indésirables courants peuvent survenir dont : mal de tête, nausée, diarrhée, somnolence et fatigue. La fonction de votre foie sera vérifié durant vos tests sanguins.

Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.

Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?

Vous devez vérifier si vous prenez bien la bonne dose. Si vous prenez des doses de delavirdine plus élevées que celles prescrites, vous risquez d'avoir plus d'effets indésirables. Si vous prenez des doses de delavirdine plus faibles que celles prescrites, il se peut que le VIH devienne résistant à la delavirdine.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la delavirdine. De plus, la delavirdine peut influencer l'effet de certains médicaments. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments remis sur ordonnance ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez

commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il pourrait être nécessaire de diminuer la dose de certains médicaments si vous prenez la delavirdine.

La delavirdine ne devrait pas être prise en même temps que la didanosine (Videx^{MC}) ou des antiacides tels que TUMS^{MC}, Roloids^{MC}, Maalox^{MC}, etc. Vous devriez plutôt prendre la delavirdine une heure avant de prendre la didanosine (Videx^{MC}) ou des antiacides.

De plus, des médicaments tels que la ranitidine (Zantac®), la famotidine (Pepcid®), l'oméprazole (Losec®), le lansoprazole (Prevacid®), le pantoprazole (Pantoloc®) et le rabéprazole (Pariet®) peuvent diminuer le taux d'absorption et l'activité de la delavirdine. Consultez votre pharmacien ou votre médecin si vous prenez un de ces médicaments.

La delavirdine ne devrait **PAS** être prise avec des antihistaminiques non sédatifs tels que : terféndine (Seldane®) et astémizole (Hismanal®). Vous pouvez toutefois prendre les antihistaminiques suivants sans danger : loratadine (Claritin®), fexofénadine (Allegra®), cétirizine (Reactine®) ou diphenhydramine (Benadryl®).

Vous ne devriez **PAS** prendre la delavirdine avec les médicaments suivants :

- Cisapride (Prepulsid®)
- Midazolam (Versed®)
- Pimozide (Orap®)
- Triazolam (Halcion®)

Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est **PAS** recommandé si vous avez une

infection par le VIH car vous pourriez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?

La delavirdine doit être gardée dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.

Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

Pharmacien : _____
Téléphone : _____

Référence : Monographie de Rescriptor® (delavirdine). Mississauga, On, Canada : Agouron Pharmaceuticals Canada Inc., 2001. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : www.tthivclinic.com

DELAVIRDINE

FEUILLET DE RENSEIGNEMENTS