

# NÉVIRAPINE

Autre NOM : Viramune®

## POURQUOI ce médicament est-il prescrit?

La névirapine est un agent antirétroviral (anti-VIH) faisant partie de la catégorie des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse (INNTI). Elle est utilisée en association avec d'autres antirétroviraux pour retarder la progression de l'infection par le VIH. Ainsi, votre système immunitaire devrait s'améliorer (augmentation de la numération des lymphocytes CD4+) et vous serez mieux protégé contre les infections.

La névirapine ne guérit pas le SIDA ni ne détruit complètement le VIH, mais peut empêcher des dommages additionnels en ralentissant la production de nouveaux virus. L'administration de névirapine ne réduit pas le risque de transmettre l'infection à d'autres personnes. Il est toujours possible de transmettre le VIH par contact sexuel, contact sanguin ou échange d'aiguilles. Vous devriez toujours utiliser les précautions appropriées pour éviter de transmettre le VIH à d'autres personnes.

## COMMENT ce médicament doit-il être pris?

En général, la dose est de 200 mg (1 comprimé) une fois par jour pendant 14 jours. La dose est ensuite augmentée à 200 mg (1 comprimé) deux fois par jour. Une dose plus faible est administrée durant les 14 premiers jours pour diminuer le risque de rougeurs (éruptions) sur la peau.

Votre dose est la suivante :

comprimé à 200 mg

Du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ au \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

\_\_\_ comprimé (\_\_\_mg) une fois par jour

puis, à partir du \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, **augmenter la dose à**

\_\_\_ comprimé (\_\_\_mg) \_\_\_ fois par jour

La névirapine peut être prise avec ou sans nourriture. Les comprimés de névirapine doivent être avalés en entier avec de l'eau.

## Que faire si vous OUBLIEZ une dose?

Si vous oubliez de prendre une dose de névirapine, prenez-la dès que possible. Cependant, si vous vous en souvenez au moment de prendre la dose suivante, ne doublez pas la dose, prenez simplement la dose habituelle.

## Pourquoi est-il important de ne pas oublier de prendre ce médicament?

Si vous oubliez de prendre une dose de névirapine, la concentration du VIH dans votre sang (charge virale) recommencera à augmenter et votre système immunitaire sera affaibli. La névirapine peut cesser d'être efficace même si vous n'oubliez que quelques doses. Un phénomène de **résistance** peut alors survenir. D'autres antirétroviraux semblables à la névirapine peuvent aussi devenir inefficaces. **Par conséquent, si vous oubliez de prendre des doses de névirapine, vous pourriez diminuer le nombre d'options de traitement pour l'avenir.** Ne cessez pas de prendre la névirapine sans d'abord en discuter avec votre médecin.

## Quels EFFETS INDÉSIRABLES peut causer ce médicament? Que devriez-vous faire si vous avez des effets indésirables?

L'effet indésirable le plus fréquemment observé avec la névirapine est une légère rougeur (éruption) sur la peau. Avisez immédiatement

votre médecin si vous avez des rougeurs sur la peau pendant que vous prenez la névirapine. La majorité des rougeurs surviennent dans les 6 premières semaines de traitement par névirapine. Si vous avez des rougeurs qui persistent pendant les 14 premiers jours du traitement, n'augmentez pas votre dose à deux fois par jour avant que les rougeurs disparaissent. Dans la majorité des cas, votre médecin peut vous recommander des médicaments pour traiter les rougeurs.

Si vous présentez une éruption grave sur la peau ou une éruption avec des symptômes tels que fièvre, ampoules, ulcères dans la bouche, rougeur dans les yeux, enflure, douleurs musculaires ou articulaires et une sensation générale de malaise, **CESSEZ** de prendre la névirapine. **Communiquez immédiatement avec votre médecin.**

D'autres effets indésirables courants comprennent : maux de tête, nausées, diarrhée, somnolence et fatigue. Votre médecin vérifiera votre sang pour déceler tout changement de la fonction de votre foie.

**Il est important de ne pas annuler vos rendez-vous chez le médecin et de vous présenter pour les tests de laboratoire afin de pouvoir suivre vos progrès.**

**Quelles autres PRÉCAUTIONS devriez-vous prendre lorsque vous utilisez ce médicament?**

Vous devez vérifier si vous prenez bien la bonne dose. Si vous prenez des doses de névirapine plus élevées que celles prescrites, vous risquez d'avoir plus d'effets indésirables. Si vous prenez des doses de névirapine plus faibles que celles prescrites, il se peut que le VIH devienne résistant à la névirapine.

Certains médicaments peuvent augmenter ou diminuer l'effet de la névirapine. De plus, la

névirapine peut influencer l'effet de certains médicaments. Vous devriez aviser votre médecin et votre pharmacien si vous prenez d'autres médicaments prescrits ou non. Vous devriez également leur dire si vous prenez des produits naturels. Si vous désirez commencer à prendre un nouveau médicament ou un produit naturel, veuillez consulter votre pharmacien au préalable.

Il pourrait être nécessaire d'augmenter la dose de certains médicaments si vous prenez la névirapine.

L'efficacité de la pilule contraceptive ou d'autres hormones utilisées pour prévenir la grossesse peut diminuer avec la prise de névirapine. Vous devriez **toujours** utiliser une deuxième méthode de contraception. En général, même si vous ne prenez pas la névirapine, vous devriez toujours utiliser des condoms pour diminuer le risque de transmettre le VIH à d'autres personnes.

Veuillez informer votre médecin si vous êtes enceinte ou désirez le devenir bientôt. Votre médecin pourra recommander le traitement approprié visant à réduire le risque de transmettre le VIH à votre enfant. L'allaitement n'est PAS recommandé si vous êtes infecté par le VIH car vous pourriez transmettre le virus à votre enfant par le lait maternel.

#### **Comment doit-on ENTREPOSER ce médicament?**

La névirapine doit être gardée dans un endroit sec et frais (15-30 °C), à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. S'assurer que le médicament n'est pas périmé en vérifiant la date de péremption (EXP) figurant sur l'emballage.

Ne pas garder ce médicament dans la salle de bains ni la cuisine. La chaleur et l'humidité pourraient affecter l'efficacité du médicament.

**Si vous avez des questions ou des préoccupations au sujet de ce médicament ou si vous avez des effets indésirables, parlez-en à votre pharmacien, votre médecin ou votre infirmière.**

**Veuillez prendre note de vos questions pour ne pas oublier de les poser.**

Vous pouvez communiquer avec le pharmacien suivant si vous avez des questions :

**Pharmacien :** \_\_\_\_\_

**Téléphone :** \_\_\_\_\_

Référence : Monographie de Viramune® (névirapine). Burlington, On, Canada : Boehringer Ingelheim (Canada) Ltd, 2002. Préparé par le Ontario HIV Pharmacy Professional Specialty Group, 2003.

D'autres feuillets de renseignements et mises à jour sur les médicaments peuvent être consultés au site : [www.tthivclinic.com](http://www.tthivclinic.com)

***NÉVIRAPINE***

***FEUILLET DE  
RENSEIGNEMENTS***